

## レジメン名：キイトルーダ+EC療法

がん種：乳がん

1コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日			備考
					1	～	21	
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg 9.9 mg	点滴静注	15分	○			
2	キイトルーダ 生理食塩液	200 mg/body 100 mL	点滴静注	30分	○			
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○			
4	エンドキサン 生理食塩液	600 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴静注	30分	○			No.6と同時に投与
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○			No.6投与前に流す
6	エピルビシン 生理食塩液	90 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	5分	○			No.4と同時に投与
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○			No.6投与後に流す
8	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○			

メモ：

◎悪心予防として下記を内服。

- ・ アプレピタント125 mg/day 化学療法初日（Day1）、化学療法開始前に内服 病院に持参  
アプレピタント80 mg/day 1×朝食後 治療翌日から内服（Day2-3）
- ・ デキサメタゾン錠4 mg/day 2×朝昼食後 3日分 治療翌日より内服開始（Day2-4）

◎術前補助化学療法としてキイトルーダ+パクリタキセル+カルボプラチン療法施行後、4コースまで施行

更新日：2023年6月