

レジメン名：キイトルーダ+アブラキサン療法

がん種：乳がん

1 コースの期間：84日

| No. | 薬品名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-----|------------------|----------------------------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|---|--------------|
| | | | | | 1 | ~ | 8 | ~ | 15 | ~ | 22 | ~ | 29 | ~ | 36 | ~ | 43 | ~ | 57 | ~ | | 64 | ~ | 71 |
| 1 | デキサメタゾン 生理食塩液 | 6.6 mg 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| 2 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 10分 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | キイトルーダ 生理食塩液 | 200 mg/body 100 mL | 点滴静注 | 30分 | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| 6 | アブラキサン 生理食塩液 | 100 mg/m ² * | 点滴静注 | 30分 | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | * (投与量÷5) mL |
| 7 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 15分 | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | |

メモ：