

## レジメン名：FOLFIRI+アービタックス療法（アービタックス1週間隔投与）

がん種：大腸がん

1コースの期間：14日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	8	～	14	
1	パロノセトロン* デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 ブチルスコポラミン*	0.75 mg 6.6 mg 5 mg 20 mg	点滴静注	15分	○		○			*Day8はパロノセトロン→生理食塩液に変更、 ブチルスコポラミンは投与しない
2	アービタックス 生理食塩液	400 mg/m <sup>2</sup> (2回目以降は250 mg/m <sup>2</sup> ) 250 mL	点滴静注	2時間**	○		○			**2回目以降は1時間で投与
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○			
4	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○					No.5と同時に投与
5	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○					No.4と同時に投与
6	フルオロウラシル 5%ブドウ糖液	400 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	急速静注	5分	○					
7	生理食塩液	50 mL	急速静注	5分	○					
8	フルオロウラシル 生理食塩液	2400 mg/m <sup>2</sup> 合計100 mL***	持続静注	46時間	○					***フルオロウラシルと合計して100 mLで投与

メモ：

◎No.8はインフューザーポンプを使用

更新日：2023年7月