

レジメン名：IRIS+アービタックス療法（アービタックス1週間隔投与）

がん種：大腸がん

1 コースの期間：28日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日								備考	
					1	～	8	～	15	～	22	～		28
1	パロノセトロン* デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 ブチルスコポラミン*	0.75 mg 6.6 mg 5 mg 20 mg	点滴静注	15分	○		○		○		○			*Day8,22はパロノセトロン →生理食塩液に変更、 ブチルスコポラミンは 投与しない
2	アービタックス 生理食塩液	400 mg/m ² (2回目以降は250 mg/m ²) 250 mL	点滴静注	2時間**	○		○		○		○			**2回目以降は1時間で投与
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○				○					
4	イリノテカン 生理食塩液	100 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分	○				○					
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○		○			
6	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服									

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m² : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m² ≦ BSA < 1.5 m² : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m² ≦ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年7月