

レジメン名：IRIS+アービタックス療法（アービタックス2週間隔投与）

がん種：大腸がん

1 コースの期間：28日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	28	
1	パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 ブチルスコポラミン	0.75 mg 6.6 mg 5 mg 20 mg	点滴静注	15分	○		○			
2	アービタックス 生理食塩液	500 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○		○			
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○			
4	イリノテカン 生理食塩液	100 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	○		○			
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○			
6	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服					

メモ：

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m<sup>2</sup> : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5 m<sup>2</sup> : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m<sup>2</sup> ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年7月