

## レジメン名：IRIS+ベバシズマブ療法

がん種：大腸がん

1 コースの期間：28日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考	
					1	～	15	～	28		
1	パロノセトロン デキサメタゾン ブチルスコポラミン	0.75 mg 6.6 mg 20 mg	点滴静注	15分	○		○				
2	ベバシズマブ 生理食塩液	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分*	○		○			*2回目は60分、 3回目以降は30分に短縮可能	
3	イリノテカン 生理食塩液	100 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	90分	○		○				
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○				
5	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服						

メモ：

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m<sup>2</sup> : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5 m<sup>2</sup> : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m<sup>2</sup> ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年7月