

## レジメン名：mFOLFOX6+アービタックス療法（アービタックス2週間隔投与）

がん種：大腸がん

1コースの期間：14日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日			備考
					1	～	14	
1	パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75 mg 6.6 mg 5 mg	点滴静注	15分	○			
2	アービタックス 生理食塩液	500 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○			
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○			
4	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○			No.5と同時に投与
5	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間	○			No.4と同時に投与
6	フルオロウラシル 5%ブドウ糖液	400 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	急速静注	5分	○			
7	生理食塩液	50 mL	急速静注	5分	○			
8	フルオロウラシル 生理食塩液	2400 mg/m <sup>2</sup> 合計100 mL*	持続静注	46時間	○			*フルオロウラシルと合計して100 mLで投与

メモ：◎No.8はインフューザーポンプを使用

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.1のデキサメタゾンを6.6 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.4のオキサリプラチンとNo.5のレボホリナートの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2023年7月