

レジメン名：mFOLFOX6+ベクティビックス療法

がん種：大腸がん

1コースの期間：14日

| No. | 薬品名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | 備考 |
|-----|---|-------------------------------------|------|------|-----|---|----|-------------------------|
| | | | | | 1 | ～ | 14 | |
| 1 | パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 0.75 mg 6.6 mg 5 mg | 点滴静注 | 15分 | ○ | | | |
| 2 | ベクティビックス 生理食塩液 | 6 mg/kg 100 mL | 点滴静注 | 1時間 | ○ | | | |
| 3 | オキサリプラチン 5%ブドウ糖液 | 85 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 2時間 | ○ | | | No.4と同時に投与 |
| 4 | レボホリナート 5%ブドウ糖液 | 200 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 2時間 | ○ | | | No.3と同時に投与 |
| 5 | フルオロウラシル 5%ブドウ糖液 | 400 mg/m ² 50 mL | 急速静注 | 5分 | ○ | | | |
| 6 | 生理食塩液 | 50 mL | 急速静注 | 5分 | ○ | | | |
| 7 | フルオロウラシル 生理食塩液 | 2400 mg/m ² 合計100 mL* | 持続静注 | 46時間 | ○ | | | *フルオロウラシルと合計して100 mLで投与 |

メモ：

◎No.7はインフューザーポンプを使用

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.1のデキサメタゾンを6.6 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.3のオキサリプラチンとNo.4のレボホリナートの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2023年7月