

レジメン名：XELIRI（カペシタビン+イリノテカン）療法

がん種：大腸がん

1 コースの期間：21日

| No. | 薬品名 | 1日投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | 備考 |
|-----|---------------------------------|---|------|------|-------------------------------|---|----|---|----|---|
| | | | | | 1 | ～ | 15 | ～ | 21 | |
| 1 | パロノセトロン デキサメタゾン ブチルスコポラミン | 0.75 mg 9.9 mg 20 mg | 点滴静注 | 15分 | ○ | | | | | |
| 2 | イリノテカン 生理食塩液 | 200 mg/m ² (150 mg/m ²) ※ 500 mL | 点滴静注 | 90分 | ○ | | | | | ※UGT1A1遺伝子多型を有する (*6または*28をホモ接合体、 ダブルヘテロ接合体) 場合 |
| 3 | 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | 10分 | ○ | | | | | |
| 4 | カペシタビン錠 | 1600 mg/m ² | 経口 | 2週間 | 1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服 | | | | | |

メモ：

◎カペシタビンは体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.31 m² : 1800 mg/day 2×朝夕食後

1.31 m² ≦ BSA < 1.69 m² : 2400 mg/day 2×朝夕食後

1.69 m² ≦ BSA < 2.07 m² : 3000 mg/day 2×朝夕食後

2.07 m² ≦ BSA : 3600 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年7月