

## レジメン名：XELIRI+ベバシズマブ療法

がん種：大腸がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	21	
1	パロノセトロン デキサメタゾン ブチルスコポラミン	0.75 mg 9.9 mg 20 mg	点滴静注	15分	○					
2	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分*	○					*2回目は60分、 3回目以降は30分に短縮可能
3	イリノテカン 生理食塩液	200 mg/m <sup>2</sup> (150 mg/m <sup>2</sup> ) ※ 500 mL	点滴静注	90分	○					※UGT1A1遺伝子多型を有する (*6または*28をホモ接合体、 ダブルヘテロ接合体) 場合
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	10分	○					
5	カペシタビン錠	1600 mg/m <sup>2</sup>	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服					

メモ：

◎カペシタビンは体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.31 m<sup>2</sup> : 1800 mg/day 2×朝夕食後

1.31 m<sup>2</sup> ≦ BSA < 1.69 m<sup>2</sup> : 2400 mg/day 2×朝夕食後

1.69 m<sup>2</sup> ≦ BSA < 2.07 m<sup>2</sup> : 3000 mg/day 2×朝夕食後

2.07 m<sup>2</sup> ≦ BSA : 3600 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年7月