

レジメン名：XELOX+アービタックス療法

がん種：大腸がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日						備考	
					1	～	8	～	15	～		21
1	パロノセトロン* デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75 mg 6.6 mg 5 mg	点滴静注	15分	○		○		○			*Day8,15はパロノセトロン →生理食塩液に変更
2	アービタックス 生理食塩液	400 mg/m ² (2回目以降は250 mg/m ²) 250 mL	点滴静注	2時間**	○		○		○			**2回目以降は1時間で投与
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○			
4	オキサリプラチン デキサメタゾン*** 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 6.6 mg 500 mL***	点滴静注	2時間	○							***CVポートから投与の場合、 デキサメタゾンは省略、 5%ブドウ糖液は500 mL→250 mLに変更
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○							
6	カペシタビン錠	2000 mg/m ²	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服							

◎カペシタビンは体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.36 m² : 2400 mg/day 2×朝夕食後

1.36 m² ≤ BSA < 1.66 m² : 3000 mg/day 2×朝夕食後

1.66 m² ≤ BSA < 1.96 m² : 3600 mg/day 2×朝夕食後

1.96 m² ≤ BSA : 4200 mg/day 2×朝夕食後

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.1のデキサメタゾンを6.6 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更（Day1のみ）

No.4のオキサリプラチンの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2023年7月