

## レジメン名：カペシタビン+ベバシズマブ療法

がん種：大腸がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	21	
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					
2	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分*	○					*2回目は60分、 3回目以降は30分に短縮可能
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					
4	カペシタビン錠	2000 mg/m <sup>2</sup>	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで内服					

メモ：

◎カペシタビンは体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.36 m<sup>2</sup> : 2400 mg/day 2×朝夕食後

1.36 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.66 m<sup>2</sup> : 3000 mg/day 2×朝夕食後

1.66 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.96 m<sup>2</sup> : 3600 mg/day 2×朝夕食後

1.96 m<sup>2</sup> ≤ BSA : 4200 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年7月