

**レジメン名：トリフルリジン・チピラシル配合錠+ベバシズマブ療法**

がん種：大腸がん

1 コースの期間：28日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日										備考		
					1	～	6	～	8	～	13	～	15	～		28	
1	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○									○			
2	ベバシズマブ 生理食塩液	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	90分*	○									○			*2回目は60分、 3回目以降は30分に短縮可能
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○									○			
4	トリフルリジン・チピラシル配合錠	70 mg/m <sup>2</sup>	経口		1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day6朝				1日2回 朝夕食後 Day8夕～Day13朝								

メモ：

◎トリフルリジン・チピラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.07 m<sup>2</sup> : 70 mg/day 2×朝夕食後

1.07 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.23 m<sup>2</sup> : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.23 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.38 m<sup>2</sup> : 90 mg/day 2×朝夕食後

1.38 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.53 m<sup>2</sup> : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.53 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.69 m<sup>2</sup> : 110 mg/day 2×朝夕食後

1.69 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.84 m<sup>2</sup> : 120 mg/day 2×朝夕食後

1.84 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.99 m<sup>2</sup> : 130 mg/day 2×朝夕食後

1.99 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 2.15 m<sup>2</sup> : 140 mg/day 2×朝夕食後

2.15 m<sup>2</sup> ≤ BSA : 150 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年7月