

レジメン名：FOLFIRINOX（フルオロウラシル+レボホリナート+イリノテカン+オキサリプラチン）療法

がん種：膵がん

1コースの期間：14日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日			備考
					1	～	14	
1	パロノセトロン デキサメタゾン ブチルスコポラミン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75 mg 9.9 mg 20 mg 5 mg	点滴静注	15分	○			
2	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○			
3	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	○			No.4と同時に投与
4	イリノテカン 5%ブドウ糖液	180 mg/m ² 250 mL	点滴静注	90分	○			No.3の開始30分後から同時に投与
5	フルオロウラシル 生理食塩液	400 mg/m ² 50 mL	急速静注	5分	○			
6	生理食塩液	50 mL	急速静注	5分	○			
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2400 mg/m ² 合計100 mL*	持続静注	46時間	○			*フルオロウラシルと合計して100 mLで投与

メモ：◎No.7はインフューザーポンプを使用

◎悪心予防として下記を内服するかホスアプレピタントを静注する。

アプレピタント125 mg/day 化学療法初日（Day1）、化学療法開始前に内服 病院に持参

アプレピタント80 mg/day 1×朝食後 治療翌日から内服（Day2-3）

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.1のデキサメタゾンを9.9 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.2のオキサリプラチンの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2024年4月