

レジメン名：GCS（ゲムシタビン+シスプラチン+S-1）療法

がん種：胆道がん

1 コースの期間：14日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	8	～	14	
1	グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg 6.6 mg	点滴静注	30分	○					
2	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液	1000 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	○					
3	シスプラチン 生理食塩液	25 mg/m ² 500 mL	点滴静注	1時間	○					
4	フロセミド	20 mg	静脈注射	ワンショット	○					
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					
6	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	1週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day8朝まで内服					

メモ：

◎並行して1000 mLの補液を実施

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m² : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m² ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2024年4月