

# レジメン名：ゲムシタビン+アブラキサン療法

がん種：膵がん

1 コースの期間：28日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日						備考	
					1	～	8	～	15	～		28
1	グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg 6.6 mg	点滴静注	30分	○		○		○			
2	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○		○		○			
3	アブラキサン 生理食塩液	125 mg/m <sup>2</sup> * **	点滴静注	30分	○		○		○			*1段階減量：100 mg/m <sup>2</sup> 2段階減量：75 mg/m <sup>2</sup> ** (投与量÷5) mL
4	生理食塩液	50 mL	点滴静注	5分	○		○		○			
5	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液	1000 mg/m <sup>2</sup> *** 100 mL	点滴静注	30分	○		○		○			***1段階減量：800 mg/m <sup>2</sup> 2段階減量：600 mg/m <sup>2</sup>
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○		○			

メモ：

◎Day15は投与せず、2投1休（1コースの期間：21日）で投与する場合もあり

◎末梢神経障害の発現時はアブラキサンのみ減量する

更新日：2024年4月