

レジメン名：SP (S-1+シスプラチン) 療法

がん種：胃がん

1 コースの期間：35日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日						備考	
					1	~	8	~	22	~		35
1	ホスアプレピタント 生理食塩液	150 mg 250 mL	点滴静注	1時間			○					※ホスネツピタント235 mgに 代替する場合もあり
2	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg 9.9 mg	点滴静注	15分			○					
3	生理食塩液	250 mL	点滴静注	1時間			○					
4	フロセミド	20 mg	静脈注射	ワンショット			○					
5	シスプラチン 生理食塩液	60 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間			○					
6	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分			○					
7	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	3週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕~Day22朝まで							

◎ホスアプレピタント静注の代替としてアプレピタントを内服する場合もあり

◎並行して1000~1500 mLの補液を実施

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m² : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m² ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年11月