

## レジメン名：SP+トラスツズマブ療法

がん種：HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃がん

1 コースの期間：21日

| No. | 薬品名                 | 1日投与量                                | 投与方法 | 投与時間   | 投与日                         |   |    |   |    | 備考                            |
|-----|---------------------|--------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---|----|---|----|-------------------------------|
|     |                     |                                      |      |        | 1                           | ～ | 15 | ～ | 21 |                               |
| 1   | ホスアプレピタント<br>生理食塩液  | 150 mg<br>250 mL                     | 点滴静注 | 1時間    | ○                           |   |    |   |    | ※ホスネツピタント235 mgに<br>代替する場合もあり |
| 2   | パロノセトロン<br>デキサメタゾン  | 0.75 mg<br>9.9 mg                    | 点滴静注 | 15分    | ○                           |   |    |   |    |                               |
| 3   | 生理食塩液               | 250 mL                               | 点滴静注 | 1時間    | ○                           |   |    |   |    |                               |
| 4   | トラスツズマブ<br>生理食塩液    | 8 mg/kg<br>(2回目以降は6 mg/kg)<br>250 mL | 点滴静注 | *90分   | ○                           |   |    |   |    | *2回目以降は30分に短縮可能               |
| 5   | フロセミド               | 20 mg                                | 静脈注射 | ワンショット | ○                           |   |    |   |    |                               |
| 6   | シスプラチン<br>生理食塩液     | 60 mg/m <sup>2</sup><br>500 mL       | 点滴静注 | 2時間    | ○                           |   |    |   |    |                               |
| 7   | 生理食塩液               | 50 mL                                | 点滴静注 | 15分    | ○                           |   |    |   |    |                               |
| 8   | テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠 | 80-120 mg/day                        | 経口   | 2週間    | 1日2回 朝夕食後<br>Day1夕～Day15朝まで |   |    |   |    |                               |

◎並行して1000～1500 mLの補液を実施

◎4週間を超えた場合：トラスツズマブ8 mg/kgで投与

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m<sup>2</sup> : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5 m<sup>2</sup> : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m<sup>2</sup> ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年11月