

レジメン名：XELOX+トラスツズマブ療法

がん種：HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	21	
1	パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75 mg 6.6 mg 5 mg	点滴静注	15分	○					※ホスネツピタント235 mgを追加する場合もあり
2	トラスツズマブ 生理食塩液	8 mg/kg (2回目以降は6 mg/kg) 250 mL	点滴静注	*90分	○					*2回目以降は30分に短縮可能
3	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					
4	オキサリプラチン デキサメタゾン 5%ブドウ糖液	130 mg/m ² 6.6 mg 500 mL	点滴静注	2時間	○					
5	5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	15分	○					
6	カペシタビン錠	2000 mg/m ²	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで					

◎4週間を超えた場合：トラスツズマブ8 mg/kgで投与

◎カペシタビンは体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.36 m²：2400 mg/day 2×朝夕食後

1.36 m² ≤ BSA < 1.66 m²：3000 mg/day 2×朝夕食後

1.66 m² ≤ BSA < 1.96 m²：3600 mg/day 2×朝夕食後

1.96 m² ≤ BSA：4200 mg/day 2×朝夕食後

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.1のデキサメタゾンを6.6 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.4のオキサリプラチンの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2023年11月