

**レジメン名：分割DCS（ドセタキセル＋シスプラチン＋S-1）療法**

がん種：胃がん

1 コースの期間：28日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	28	
1	ホスアプレピタント 生理食塩液	150 mg 250 mL	点滴静注	1時間	○		○			※ホスネツピタント235 mgに 代替する場合もあり
2	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg 9.9 mg	点滴静注	15分	○		○			
3	生理食塩液	250 mL	点滴静注	1時間	○		○			
4	フロセミド	20 mg	静脈注射	ワンショット	○		○			
5	シスプラチン 生理食塩液	35 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴静注	2時間	○		○			
6	ドセタキセル 生理食塩液	35 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間	○		○			
7	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○		○			
8	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで					

◎並行して1000～1500 mLの補液を実施

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA < 1.25 m<sup>2</sup> : 80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m<sup>2</sup> ≤ BSA < 1.5 m<sup>2</sup> : 100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m<sup>2</sup> ≤ BSA : 120 mg/day 2×朝夕食後

更新日：2023年11月