

## レジメン名：フェスゴ+ドセタキセル+カルボプラチン療法

がん種：乳がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日			備考
					1	～	21	
1	フェスゴ配合皮下注	初回はIN、 2回目以降はMAを投与	皮下注射	8分以上*	○			*2回目以降は5分以上かけて皮下注射
2	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg 3.3 mg	点滴静注	15分	○			
3	ドセタキセル 生理食塩液	75 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	1時間	○			
4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC 6 250 mL	点滴静注	1時間	○			
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○			

メモ：

◎悪心、浮腫予防として下記内服を推奨。

- ・ アプレピタント125 mg/day 化学療法初日（Day1）、化学療法開始前に内服 病院に持参  
アプレピタント80 mg/day 1×朝食後 治療翌日から内服（Day2-3）
- ・ デキサメタゾン錠8 mg/day 2×朝昼食後 2日分 治療翌日より内服開始（Day2-3）

◎ドセタキセル+カルボプラチンは6コースまで、フェスゴは合計18コース（1年間）まで

◎前回投与日から6週間以上空いた場合は改めてフェスゴINを投与し、次回以降はフェスゴMAを投与

更新日：2024年10月