

レジメン名：DOS（ドセタキセル+オキサリプラチン+S-1）療法

がん種：胃がん

1 コースの期間：21日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日					備考
					1	～	15	～	21	
1	パロノセトロン デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75 mg 6.6 mg 5 mg	点滴静注	15分	○					※ホスネツピタント235 mg を追加する場合もあり (その場合は30分投与)
2	オキサリプラチン デキサメタゾン 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 6.6 mg 500 mL	点滴静注	2時間	○					
3	5%ブドウ糖液	50 mL	点滴静注	15分	○					
4	ドセタキセル 生理食塩液	40 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間	○					
5	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分	○					
6	テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠	80-120 mg/day	経口	2週間	1日2回 朝夕食後 Day1夕～Day15朝まで					

メモ：

◎術前補助化学療法として原則3コース実施

◎テガフル・ギメラシル・オテラシル配合錠は体表面積（BSA）にあわせて下記の用法・用量にて内服

BSA<1.25 m²：80 mg/day 2×朝夕食後

1.25 m²≦BSA<1.5 m²：100 mg/day 2×朝夕食後

1.5 m²≦BSA：120 mg/day 2×朝夕食後

◎アレルギー対策強化レジメンの場合は下記のように変更

No.1のデキサメタゾンを6.6 mg→16.5 mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を5 mg→10 mgに変更

No.2のオキサリプラチンの投与時間を2時間→4時間に変更

更新日：2025年4月