

レジメン名：GC（ゲムシタビン+シスプラチン）療法

がん種：尿路上皮がん

1 コースの期間：28日

No.	薬品名	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日									備考
					1	2	3	～	8	～	15	～	28	
1	グラニセトロン デキサメタゾン	3 mg 3.3 mg	点滴静注	30分	○				○		○			
2	ゲムシタビン 5%ブドウ糖液	1000 mg/m ² 100 mL	点滴静注	30分	○				○		○			
3	硫酸マグネシウム注射液1mEq/mL 生理食塩液	20 mL 1000 mL	点滴静注	2時間		○								
4	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75 mg 9.9 mg	点滴静注	30分		○								
5	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分			○							
6	20%マンニトール注射液	300 mL	点滴静注	30分		○								
7	シスプラチン 10%塩化ナトリウム注射液 生理食塩液	70 mg/m ² 120 mL 300 mL	点滴静注	2時間		○								
8	20%マンニトール注射液	300 mL	点滴静注	30分		○								
9	生理食塩液	50 mL	点滴静注	15分					○		○			

◎Day1-3に500～2500 mLの補液を実施

◎悪心予防として下記を内服

・ アプレピタント125 mg/day Day2 化学療法開始前に内服 ・ アプレピタント80 mg/day Day3-4 1×朝食後

更新日：2025年4月